

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

**Câu 1:** Ví dụ nào dưới đây là cơ quan tương đồng?

- A. Cánh chim và cánh côn trùng.                      B. Ngà voi và sừng tê giác.  
C. Vòi voi và vòi bạch tuộc.                              D. Cánh dơi và tay người.

**Câu 2:** Ở người, đột biến mất một phần vai dài nhiễm sắc thể số 22 có thể gây bệnh

- A. bạch tạng.                                                      B. máu khó đông.  
C. ung thư vú.                                                      D. ung thư máu ác tính.

**Câu 3:** Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của vật nuôi và cây trồng là

- A. chọn lọc tự nhiên.                                              B. biến dị cá thể.  
C. chọn lọc nhân tạo.                                              D. chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên.

**Câu 4:** Vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều. Đây là dạng biến động số lượng cá thể

- A. theo chu kì nhiều năm.                                      B. không theo chu kì.  
C. theo chu kì mùa.                                              D. theo chu kì ngày đêm.

**Câu 5:** Mỗi gen cấu trúc gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit: vùng điều hoà, vùng mã hoá và vùng kết thúc. Vùng mã hoá

- A. mang tín hiệu kết thúc dịch mã.  
B. mang thông tin mã hoá các axit amin.  
C. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát phiên mã.  
D. mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

**Câu 6:** Hiệu suất sinh thái là

A. tỉ lệ phần trăm năng lượng bị tiêu hao (chủ yếu qua hô hấp) giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.

- B. tỉ lệ phần trăm năng lượng chuyển hoá từ môi trường vào quần xã sinh vật trong hệ sinh thái.  
C. tỉ lệ phần trăm chuyển hoá vật chất giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.  
D. tỉ lệ phần trăm chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.

**Câu 7:** Diễn thế nguyên sinh

- A. xảy ra do hoạt động chặt cây, đốt rừng,... của con người.  
B. thường dẫn tới một quần xã bị suy thoái.  
C. khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật.  
D. khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã tương đối ổn định.

**Câu 8:** Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội  $2n = 24$ , tế bào sinh dưỡng của thể ba ( $2n + 1$ ) có số lượng nhiễm sắc thể là

- A. 25.                                      B. 24.                                      C. 26.                                      D. 23.

**Câu 9:** Bản chất quy luật phân li của Mendel là

- A. sự phân li đồng đều của các alen về các giao tử trong quá trình giảm phân.  
B. sự phân li kiểu hình ở  $F_2$  theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.  
C. sự phân li kiểu hình ở  $F_2$  theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.  
D. sự phân li kiểu hình ở  $F_2$  theo tỉ lệ 3 : 1.

**Câu 10:** Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen ở thế hệ xuất phát là  $0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1$ . Tần số alen A và a lần lượt là

- A. 0,5 và 0,5.                                      B. 0,6 và 0,4.                                      C. 0,7 và 0,3.                                      D. 0,2 và 0,8.

**Câu 11:** Trong bộ Linh trưởng, loài nào dưới đây có quan hệ họ hàng xa loài người nhất?

- A. Đười ươi.                      B. Vượn Gibbon.                      C. Tinh tinh.                      D. Gôri-la.

**Câu 12:** Ở người, bệnh mù màu đỏ và lục do gen lặn (a) trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Một trong các đặc điểm của bệnh này là

- A. thường gặp ở nam, hiếm gặp ở nữ.                      B. di truyền trực tiếp từ bố cho 100% con trai.  
C. xuất hiện phổ biến ở nữ, ít xuất hiện ở nam.                      D. chỉ xuất hiện ở nữ, không xuất hiện ở nam.

**Câu 13:** Nguyên nhân gây bệnh pheninkêto niệu ở người là do một loại

- A. đột biến gen.                      B. vi khuẩn.  
C. đột biến lệch bội.                      D. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

**Câu 14:** Loại đột biến nào sau đây **không** phải là đột biến gen?

- A. Đột biến mất một cặp nuclêôtit.                      B. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể.  
C. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.                      D. Đột biến thêm một cặp nuclêôtit.

**Câu 15:** Một "không gian sinh thái" mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là

- A. nơi ở.                      B. giới hạn sinh thái.                      C. sinh cảnh.                      D. ổ sinh thái.

**Câu 16:** Trong trường hợp các gen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau, cơ thể có kiểu gen aaBbCcDd khi giảm phân có thể tạo ra tối đa số loại giao tử là

- A. 8.                      B. 4.                      C. 2.                      D. 16.

**Câu 17:** Nhân tố tiến hoá **không** làm thay đổi tần số alen nhưng lại làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể giao phối là

- A. giao phối không ngẫu nhiên.                      B. di - nhập gen.  
C. đột biến.                      D. các yếu tố ngẫu nhiên.

**Câu 18:** Sự hợp tác chặt chẽ giữa hải quỳ và cua là mối quan hệ

- A. hợp tác.                      B. hội sinh.  
C. ức chế - cảm nhiễm.                      D. cộng sinh.

**Câu 19:** Đặc điểm nào dưới đây **không** có ở thể tam bội (3n)?

- A. Số lượng ADN tăng lên gấp bội.  
B. Tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn.  
C. Luôn có khả năng sinh giao tử bình thường, quả có hạt.  
D. Khả phổ biến ở thực vật, ít gặp ở động vật.

**Câu 20:** Theo quan niệm hiện đại, nguồn nguyên liệu chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là

- A. đột biến nhiễm sắc thể.                      B. đột biến gen.  
C. biến dị tổ hợp.                      D. thường biến.

**Câu 21:** Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật đóng vai trò phân huỷ chất hữu cơ thành chất vô cơ trả lại môi trường là

- A. động vật ăn thực vật.                      B. động vật ăn thịt.  
C. vi khuẩn hoại sinh và nấm.                      D. thực vật.

**Câu 22:** Loài lúa mì (*Triticum aestivum*) có bộ nhiễm sắc thể  $6n = 42$  được hình thành bằng cơ chế

- A. cách li tập tính.                      B. cách li địa lí.  
C. lai xa kèm đa bội hoá.                      D. cách li sinh thái.

**Câu 23:** Trong chọn giống thực vật, khi sử dụng consixin để tạo giống mới có năng suất cao sẽ **không** có hiệu quả đối với

- A. lúa.                      B. củ cải đường.                      C. khoai tây.                      D. dâu tằm.

**Câu 24:** Trong một quần thể động vật giao phối, một gen có 2 alen A và a, gọi p là tần số của alen A và q là tần số của alen a. Quần thể được gọi là đang ở trạng thái cân bằng di truyền khi tỉ lệ các kiểu gen của quần thể tuân theo công thức:

- A.  $p^2 + 4pq + q^2 = 1$ .                      B.  $p^2 + pq + q^2 = 1$ .                      C.  $p^2 + 2pq + q^2 = 1$ .                      D.  $p^2 + q^2 = 1$ .

**Câu 25:** Trong phép lai một tính trạng do một gen quy định, nếu kết quả phép lai thuận và lai nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng nghiên cứu

- A. nằm trên nhiễm sắc thể thường.                      B. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.  
C. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y.                      D. nằm ở ngoài nhân (trong ti thể hoặc lục lạp).

**Câu 26:** Trong các loại nuclêôtit cấu tạo nên phân tử ADN **không** có

A. Uraxin (U).                      B. Timin (T).                      C. Adênin (A).                      D. Guanin (G).

**Câu 27:** Trong quan hệ cùng loài, hiện tượng liên rễ ở hai cây thông nhựa mọc gần nhau là ví dụ về mối quan hệ

A. hỗ trợ.                                              B. hội sinh.  
C. ức chế - cảm nhiễm.                      D. cạnh tranh.

**Câu 28:** Đối tượng chủ yếu được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen, hoán vị gen và di truyền liên kết với giới tính là

A. bí ngô.                      B. đậu Hà Lan.                      C. cà chua.                      D. ruồi giấm.

**Câu 29:** Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho giao phấn giữa hai cây cà chua tứ bội đều có kiểu gen AAaa. Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là

A. 11 quả đỏ : 1 quả vàng.                      B. 3 quả đỏ : 1 quả vàng.  
C. 100% quả đỏ.                      D. 35 quả đỏ : 1 quả vàng.

**Câu 30:** Chuỗi pôlipeptit được tổng hợp ở tế bào nhân thực được mở đầu bằng axit amin

A. prôlin.                      B. mêtiônin.                      C. triptôphan.                      D. foocmin mêtiônin.

**Câu 31:** Phát biểu nào sau đây về tần số hoán vị gen là đúng?

A. Tần số hoán vị gen luôn bằng 50%.  
B. Tần số hoán vị gen lớn hơn 50%.  
C. Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%.  
D. Các gen nằm càng gần nhau trên một nhiễm sắc thể thì tần số hoán vị gen càng cao.

**Câu 32:** Biện pháp nào sau đây **không** được sử dụng để bảo vệ vốn gen của loài người?

A. Tăng cường sử dụng thuốc hoá học (thuốc trừ sâu, diệt cỏ) trong sản xuất nông nghiệp.  
B. Tư vấn di truyền và sàng lọc trước sinh.  
C. Liệu pháp gen.  
D. Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân đột biến.

**Câu 33:** Ở một loài thực vật, các gen quy định các tính trạng phân li độc lập và tổ hợp tự do. Cho cơ thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen aabb ở đời con là

A. 2/16.                      B. 1/16.                      C. 9/16.                      D. 3/16.

**Câu 34:** Trong quá trình hình thành quần thể thích nghi, chọn lọc tự nhiên có vai trò

A. tạo ra các kiểu hình thích nghi.  
B. sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi.  
C. tạo ra các kiểu gen thích nghi.  
D. ngăn cản sự giao phối tự do, thúc đẩy sự phân hoá vốn gen trong quần thể gốc.

**Câu 35:** Người đầu tiên đưa ra học thuyết về sự tiến hoá của sinh giới là

A. Menden.                      B. Đacuyn.                      C. Moocgan.                      D. Lamac.

**Câu 36:** Cừu Đôly được tạo ra bằng kĩ thuật

A. chuyển gen.                                              B. gây đột biến nhân tạo.  
C. nhân bản vô tính.                                              D. cấy truyền phôi.

**Câu 37:** Một trong những phương pháp được sử dụng để làm biến đổi hệ gen của cơ thể sinh vật là

A. nhân bản vô tính.                                              B. lai tế bào xôma.  
C. cấy truyền phôi.                                              D. đưa thêm một gen lạ vào hệ gen.

**Câu 38:** Ở ruồi giấm, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội  $2n = 8$ . Số nhóm gen liên kết của loài này là

A. 6.                      B. 4.                      C. 8.                      D. 2.

**Câu 39:** Môi trường sống của loài giun đũa ký sinh là gì?

A. Môi trường đất.                                              B. Môi trường trên cạn.  
C. Môi trường sinh vật.                                              D. Môi trường nước.

**Câu 40:** Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó cần tạo ra các cá thể

A. có kiểu gen khác nhau.                                              B. có cùng kiểu gen.  
C. có kiểu hình giống nhau.                                              D. có kiểu hình khác nhau.

----- HẾT -----